

- B. { Tiges glabres ou légèrement verruqueuses, mais non hérissées; feuilles tuberculuses, hérissées, linéaires, oblongues, 4-5 fois plus longues que larges; corolle bleue; nucules rougeâtres, obtus. — *L. lithospermoides* S. L. M. Moore, *loc. cit.*, p. 257, tab. 424, fig. A.
- { Tiges et feuilles hérissées, tuberculuses; feuilles obovales, 2 fois plus longues que larges; corolles mauves; nucules blanchâtres, aigus. — *L. mauritanica*.

**Leurocline mauritanica** nov. sp.

Fruticulus humilis, divaricato-ramosus, ramis tortuosis, rigidis, foliosis. Folia alterna, erecta, sessilia, leviter amplexicaulia, obovata, obtusa, crassa, subcarnosa, viridi-glaucescens, margine revoluta, 4-9 mill. longa, 3-4 mill. lata, pilis rigidis basi albo-verrucatis obsita; superiora floralia gradatim in bracteas abeuntia, sæpissime cærulescentia. Flores axillares, solitarii, sessiles rachi-adpressi. Calyx 5-partitus, lobis aliquid inæqualibus, extus tuberculato-pilosis, intus dense hirsutis. Corolla, malvaceo-colore, tubulosa, bilabiata: tubus 7-mill. longus, subarcuatus, extus glaber vel obscure pruinosis, ad faucem ampliatus et piloso-hirsutus; limbi labium superius erecto-patens, bilobum, inferius 3-lobum, patens vel reflexum. Antheræ inclusæ, oblongo-lineares, versatiles, filamentis brevissimis, sub fauce, infra medium tubi, insertis. Stylus filiformis, glaber, stigmatè parvo, bilobo. Nucule albescentes, nitidæ, ovoïdeo-triungulares, acuminatæ, tuberculato-rugosæ vel verrucosæ; areola ovata, plana, lata, basilari, annulo cineta, gynobasi affixæ,

*Hab.* — In arenosis Africae occidentalis, circa Port-Étienne, a cl. Clu-deau fl. et fruct. 21 martis 1908 lecta.

---

UNE COLLECTION RÉCENTE DE SCITAMINÉES DU GABON  
FAITE PAR M. LE TESTU,

DÉTERMINÉE PAR M. F. GAGNEPAIN.

M. G. Le Testu ayant envoyé au Muséum une collection intéressante de Scitaminées du Gabon, j'en donne la liste suivante où on trouvera l'indication de plusieurs espèces nouvelles qui seront publiées dans le *Bulletin de la Société botanique de France* vers la fin de l'année. Un genre nouveau a pu être créé grâce aux excellents matériaux dus à M. G. Le Testu; on en trouvera la description dans le *Bulletin* qui vient d'être cité.

**Zingibéracées.**

- COSTIS FISSILIGULATUS* Gagnep. in *Bull. Soc. bot. Fr.* (1902), p. 93. — Mayomba, 23 janvier 1907, n° 969.
- C. AFER* Ker Gawl. — Ganda, 15 oct. 1907, n° 1191, et Tchibanga, 12 nov. 1907, n° 1218.
- C. LUCANUSIANUS* K. Sch. — Tchibanga, mai 1907, n° 1030, et Mayomba, mars 1907, n° 1004.
- AFRANOMUM MASUIANUM* de Wild. et Dur. — Mayomba, 25 janvier 1907, n° 971.
- Af. pruinosa* Gagnep. nov. sp. — Dabilila, sept. 1907, n° 1152, 1166. — Cette espèce nouvelle, qui ressemble sous certains rapports à *Af. giganteum* K. Sch., sera décrite prochainement au *Bulletin Soc. bot. France*.
- Af. Letestuanum* Gagnep. nov. sp. — Mayomba, 22 sept. 1907, n° 1164 et *bis*. — Espèce voisine de la précédente qui sera décrite également au *Bull. Soc. bot. France*.
- AF. LIMBATUM* K. Sch. — Massanga, 30 sept. 1907, n° 1171.
- RENEALMIA CONGOENSIS* Gagnep. *Bull. Soc. bot. Fr.* (1902), p. 30. — Mayomba, 1<sup>er</sup> février 1907, n° 975.

**Marantacées.**

- SARCOPHYRNIUM VELUTINUM?* K. Sch. — Tchibanga, 25 juin 1907, n° 1005. — Détermination douteuse, faute de fleurs.
- S. OXYCARPUM?* K. Sch. — Tchibanga, mai 1907, n° 1006 et 1006 *bis*. — Détermination douteuse, faute de fleurs.
- S. LEIOGONUM?* K. Sch. — Tchibanga, juin 1907, n° 1041. — Faute de fleurs, détermination douteuse.
- TRAGIOPHYRNIUM DANKELMANIANUM* K. Sch. — N° 1217.
- T. VIOLACEUM* Ridl. — Tchibanga, juin 1907, n° 1202.
- HYBOPHYRNIUM BRAUNIANUM* K. Sch. — Tchibanga, mai 1907, n° 1033.
- CLINOGYNE HENSH* K. Schum. — Tchibanga, mai 1907, n° 1007 *bis*.
- Atænidia gabonensis* Gagnep., nov. gen. nov. sp. — Tchibanga, 15 sept. 1907, n° 1154. — Genre qui sera publié au *Bull. Soc. bot. France*; avait été confondu avec les *Phrygium* et les *Calathea*.